


校內毒蛇咬傷緊急處理流程圖

毒蛇咬傷



- 1.一律以有毒蛇咬處理，安排就醫
- 2.脫下戒子、手環，以彈性繃帶或絲襪包紮患肢，患肢位置低於心臟
- 3.不要用嘴吸傷口、不要切開傷口、不要冰敷、不能用止血帶



- 1.現場人員（同學、助教或老師）立即打119叫救護車，將傷病患送至台中榮總（備有毒蛇血清）
- 2.聯絡衛保組(23590227)

聯絡系教官、助教、導師、家長

非上班時間請聯絡
校安中心
(23509595)

護送

情況回報

資料存查

感謝學生事務處衛保組資料提供

被蛇咬傷處理方式



- 一、到醫院前的處置
- 儘可能觀察並認清蛇的形狀、顏色及其他特徵，如可能用相機拍照。
- 保持鎮靜，避免亂動肢體，以免加速蛇毒的吸收。
- 移除肢體上的束縛物，包括戒指、手錶等。
- 患肢保持低於心臟之位置，儘快以彈性繃帶或具彈性的寬衣料等，給予壓迫性包紮，或以夾板、護木固定患肢，使其不能亂動。
- 勿使用橡皮止血帶，易造成局部循環變差，使肢體腫脹更加厲害，組織大量壞死。
- 避免以口吸，以免口內有傷口造成救援者之傷害或病人之傷口感染。
- 不要切開局部傷口：毒液常注入較深部組織，切開傷口並無法將毒液清出，反而容易造成感染或癒合不良。
- 不要使用冰敷或冷敷，反使局部血液循環變差，使肢體腫脹更加惡化，組織壞死。
- 不要喝酒或刺激性物質，以免促進血液循環，反而使毒液吸收更快，使症狀提早出現。

被蛇咬傷處理方式

二、台灣地區常見毒蛇種類

(一) 出血性毒蛇：

青竹絲：外觀特徵為背部鮮綠色，腹部黃綠色，尾部磚紅色。咬傷時，毒牙痕明顯，局部會疼痛、腫脹，皮下可見瘀血。



被蛇咬傷處理方式

二、台灣地區常見毒蛇種類

(一) 出血性毒蛇：

龜殼花：背部中央有一行較大且具黑邊之暗茶色斑塊，前後連續並向左右彎曲面呈波浪狀。咬傷時毒牙痕明顯，局部會疼痛、腫脹，皮下可見瘀血，少數有水泡或血泡。



被蛇咬傷處理方式

二、台灣地區常見毒蛇種類

(一) 出血性毒蛇：

百步蛇：背部兩側有黑褐色倒三角形斑，左右連成如沙漏狀，嘴間向上翹。咬傷時局部劇烈疼痛，皮下迅速腫脹，皮膚表面很快出現多個大小不一的水泡及血泡，咬痕處會持續滲血。



被蛇咬傷處理方式

二、台灣地區常見毒蛇種類

(二) 神經性毒蛇：

雨傘節：全身為黑寬白窄相間的斑紋。咬傷時局部有針刺感，隨後有麻木感，全身肌肉無力。



被蛇咬傷處理方式

二、台灣地區常見毒蛇種類

(二) 神經性毒蛇：

眼鏡蛇：頸部有一較完整白色帶狀斑，上有一對黑點，受驚嚇時上身仰起，頸部噴張，會發出嘶嘶噴氣聲。咬傷局部會紅腫疼痛組織壞死，全身性症狀則有頭昏、噁心、嘔吐、眼皮下垂、吞嚥困難等。



被蛇咬傷處理方式

二、台灣地區常見毒蛇種類

(三) 出血性暨神經性毒蛇：

鎖鏈蛇：有三縱列暗色或深褐色橢圓形斑紋，有如鎖鏈狀，中列較大，延伸至頭背部。咬傷後，局部會腫痛、瘀血、起水泡或血泡。

